Aggression und emotionale Dysregulation

Paul Plener

Interessenskonflikte

- Forschungsförderung:
 - BMBF
 - BfArM
 - Volkswagen Stiftung
 - Baden-Württemberg Stiftung
 - Lundbeck
 - Servier
- Vortragshonorar:
 - Shire
- Keine Aktienbeteiligung, kein Advisory board pharm. Industrie

Überblick

- Aggression
- Diagnosen: ICD-10, DSM-5 und ICD-11
- CU traits
- DMDD
- Ausblick
- Diskussion

Ätiologie

HOT/COLD Aggression

Hans Steiner (2005)

HOT

RADI

- **R**eactive
- **A**ffective
- **D**efensive
- **I**mpulsive

COLD

PIP

- **P**lanned
- **I**nstrumental
- **P**roactive

Klassifikation

- Kontext
 - fam. Rahmen
 - soz. Bindungen
- Opp. aufs. Verhalten
- Komorbiditäten
 - ADHS
 - Depression
 - Emotionen

- Alter
 - Childhood onset
 - adol. onset
- **WLPE**
- Opp. aufs. Verhalten
- Komorbiditäten

- Alter
 - Childhood onset
 - adol. onset
- **WLPE**
- Opp. aufs. Verhalten
 - **With chronic irritability-anger**

- Affektive Störungen
- **DMDD**

Störung des Sozialverhaltens: Einteilung

Alter:

Beginn in
Kindheit
(<10a) oder
Adoleszenz

Komorbide Störungen:

ADHS
Angst
Depression

Callous Un- emotional traits:

Hoch oder
niedrig

Typ der Aggr.:

Proaktiv
oder reaktiv

Neuroanatomie der Aggression

- Schädigung des frontalen Cortex:
HOT ↑
- Läsion, Tumor od. Epilepsie d.
Temporallappens: aggressives
Verhalten

- fMRT:
 - Aktivität im (prä)frontalen Cortex ↓: b.
Menschen mit HOT ↑
 - Höhere Aktivierung im PFC: weniger
hohe Aggressionsscores
 - Amygdala Aktivität ↑ beim Betrachten
wütender Gesichtsausdrücke b.
Menschen mit HOT

- Amygdala Aktivität ↓ b. COLD

Psychophysiologie: kurze Einführung

- Hautleitwiderstand (SC): primär Sympathikus Maß
- HR: Sympathikus/ Parasympathikus: größere HRV adaptive emotionale Regulation, reduzierte HRV: emotionale Dysregulation
- Respiratorische Sinusarrhythmie (RSA): Einfluss des Parasympathikus auf HRV: geringe RSA in Ruhe: Maß für schlechte Emotionsregulation
- Gesichts EMG: M. corrugator supercilii, M. zygomaticus Major: empathisches Reagieren
- Blinzel-Startle Reflex: Reflexamplitude: durch Kontext mit negativer Valenz erhöht (Furcht,..), fehlende Startle Potenzierung: geringere Amygdalaaktivierung

Typen und Psychophysiologie

- Syst. Review (n=75 Studien): deutlichste Unterscheidung: mit oder ohne CU traits
- 2 Gruppen von SSV:

**SSV+komorbide
internalisierende Störung,
ängstlich, emotionale
Dysregulation, viel reaktive
Aggression, feindseliger
Attributionsbias**

- hohe HR und SC (autonomes hyper-arousal)
- geringe HRV und RSA in Ruhe, hohe RSA Reaktivität
- hohe SC und Startle Reaktivität b. aversiven und furchteinflössenden Stimuli
- keine EMG Defizite

**SSV+CU, antisoziales
Verhalten, geringe Angstlevel,
wenig Bestrafungssensitivität**

- geringe HR und SC in Ruhe und Reaktivität (autonomes under-arousal)
- geringe SC und Startle Reaktivität bei aversiven und furchteinflössenden Stimuli
- geringe M. corr. supercil. Aktivität nach Exposition zu neg. Emotionen

CU Diagnostik

- Antisocial Process Screening Device (APSD) (Frick & Hare, 2001)
- Inventory of callous unemotional traits (ICU) (Frick, 2004)
- Youth Psychopathic Traits Inventory (YPI) (Andershed et al., 2002)
- Child hood Psychopathy Scale (CPS) (Lynam et al., 2005)
- UNSW system (Dadds et al., 2005)
- Child Problematic Traits Inventory (CPTI) (Colins et al., 2014)
- Triarchic Psychopathy Measure (TriPM) (Patrick, 2010)
- Clinical Assessment of Prosocial Emotions (CAPE) (Frick, 2013)

CU: Follow up

- FU (8.→14. Lj.): n=144 (alle CBT: Eltern/Patient, 15M);
- Naturalistischer Verlauf: n=59
- CU traits nehmen zunächst ab, Stabilisierung in der Adoleszenz
- Positives Elternverhalten↑ → CU:↓

- Höhere CU Level Baseline und geringere Abnahme:
 - Risiko für SSV Diagnose ↑
 - Überweisung in psychiatr. Hilfesystem ↑
 - Substanzkonsum ↑

CU: klinisch relevant?

CU traits: relativ furchtlos, geringere Reaktion auf Bestrafungen

CU traits: anderes Ansprechen auf Therapie

- Geringeres Ansprechen auf Elterninterventionen
- Gleiches Ansprechen auf Verwendung positiver Verstärker und Förderung prosozialen Verhaltens
- Geringeres Ansprechen auf negative Verstärker
- Geringeres Ansprechen auf Time-Outs

Therapie: CU

- Syst. Review: n=19 Studien (RCT: 8/19)
 - CBT, Elterntrainings, system. Ansätze, Psychoedukation, Emotionserkennungstraining, Soziales Kompetenztraining, Aggressionstraining, Stimulantien
- CU Symptome↓: 4/7 Studien: CBT, Familientherapie, Gruppe, Soz. Kompetenztraining
- Schlechteres Therapie-Outcome bei SSV/antisoziales Verhalten wenn CU traits: 7/15 Studien
- Hohe CU Scores bei SSV: besserer Behandlungserfolg und dennoch höhere Werte am Ende, da Baseline höher (Bansal et al., 2019)

SSV Interventionen helfen bei CU

- 6a FU des Coping Power Programms (n=107): 9a-15a
- CPP: 24 Gruppensitzungen und 16 Elternsitzungen vs. wöchentliche Multi-Komponenten Therapie (individuell)
- Beide Programme: Abnahme von externalisierendem Verhalten und Substanzkonsum (stärker in CCP)
- Nur in CPP: Reduktion von CU:
 - ev. Gruppentherapie Effekt?

DMDD: Prävalenz

- nicht-klinischen Stichprobe:
 - ca. 1% (Hudziak et al., 2005, Stringaris et al., 2018)
 - Altersgruppen: 3-Monats-Prävalenzen (Copeland et al., 2013):
 - Vorschüler: 3,3% (ohne Alterskriterium)
 - 9-13-jährige: 1,1%
 - 9-17-jährige: 0,8%
 - kumulierte Prävalenz (18 Jahre): 4.4%.
- Deutsche kinder- und jugendpsychiatrischen Stichprobe:
4,1%-6.6% (Juksch et al., 2011; Holtmann et al., 2008)

Prävalenz bei Erwachsenen

- N=2505, 14-94 Jahre
- Retrospektiv: 19 (0,8%) haben Kriterien im Grundschulalter erfüllt:
 - häufiger arbeitslos, seltener in Partnerschaft
 - 17 (89,3%) davon, min. eine psychiatr. Erkrankung diagnostiziert worden
 - 12 (0,5%) erfüllen sie momentan noch (63,2% Persistenz)

Verlauf

- D: Mit 19 Jahren:
 - höheres Risiko für:
 - Substanzkonsum (Alkohol und Cannabis),
 - affektive Störungen
 - ADHS
 - Suizidalität (Gedanken und Versuche).
 - Keine erhöhte Rate an bipolaren Störungen
- USA: 14, bzw. 20 Jahres Follow-up bei Erwachsenen: erhöhtes Risiko:
 - depressive Störungen
 - Angststörungen
 - disruptive Verhaltensstörungen
 - Drogenabusus

Verlauf

- Great Smoky Mountains Study, N=1273, 6 Erhebungen 10-16 Jahre, drei Erhebungen mit 19, 21 und 24-26 Jahre
- DMDD in Kindheit: 4,1%
- DMDD in der Kindheit: Angst- und Depressionswerte erhöht, ärmer, häufiger Polizeikontakte, geringere akademische Abschlüsse, mehr STDs, häufiger Rauchen

Psychotherapie und -pharmakologie

- Systematischer Review: 57 offene Studien, 28 RCTs
- *„We could not find any clinical trial reporting on the treatment of this disorder“*
- Psychostimulanzien (v.a. b. ADHS) und Verhaltenstraining
- Risperidon oder Valproat als Alternative
- PMT bei jüngeren Kinder, CBT bei Jugendlichen

Behandlungsalgorithmus: Reizbarkeit

- CBT und PMT (neu: Interpretation Bias Training)
- Psychopharmakologisch:
 - Bei ADHS: MPH
 - Lithium: Keine Evidenz
 - SSRI: v.a. vs. Reizbarkeit
 - Mood Stabilizer: kaum Evidenz
 - AAP: kaum Evidenz, letzte Reserve

Syst. Review: DMDD Therapie

- Systematischer Review für DMDD Studien (n=8): 3 RCTs, 4 open pilot studies, ein case report
- Psychotherapie: 3 Studien:
 - Reduktion bei ADHS + DMDD
 - DMDD in Adoleszenten
- Pharmakologie: 4 Studien:
 - Reduktion bei ADHS+DMDD durch MPH
 - Keine Unterschiede durch Lithium Gabe
 - Reduktion von Reizbarkeit durch Risperidon
 - ADHS + DMDD: Reduktion durch Naltrexon (n=1)

RCT: ADHS+DMDD

- RCT (n=56, 7-12a: ADHS +DMDD)
- 11 Wochen Therapie (105 min. Eltern und Kindgruppen) od. community based psychosocial treatment (TAU)
- Verbesserung in Reizbarkeit (Elternrating: ES: 0,63)
- Keine Verbesserung Mood Severity Index (CDRS-R/YMRS):
 - nur bei denen, die Mehrheit der Sitzungen wahrnahmen (ES: 0,53)
- Effekt verschwindet nach Therapie

IPT und DMDD

- Randomisierte Pilotstudie (n=19, 12-17a):
 - IPT (10) vs. TAU (9): 24 Wochen
- Eltern und Kinder: IPT+mehr Focus auf Wutausbrüche und deren Management
- Eltern:
 - zu Beginn (Psychoedukation)
 - in der Mitte (Bearbeitung Eltern-Kind Beziehung)
 - Ende: Veränderungen und weiterer Bedarf
- 80% completer in der IPT Gruppe, 78% in TAU
- CGI-S (ES: 1,56) , CGI-I (ES: 1,25) und CGAS: größere Verbesserung in IPT Gruppe
- K-SADS (Ende):
 - IPT: 1/8 (12,5%) erfüllt DMDD Kriterien
 - TAU: 4/7 (57,1%) erfüllen DMDD Kriterien

DBT hilft auch bei DMDD

- RCT: n=43 DBT-c (21) vs. Tau (22): 7-12a: 32w, 3m FU
- Individuelle Therapie: Eltern+Kind (32w), Skills Training, Telephoncoaching
- 2 Booster Sitzungen/Monat
- Kein drop out in DBT-C
- Positiver response (CGI-I): DBT-C: 90,4%, TAU: 45,5% (p=.002)
- Remission: DBT-C: 52,4% vs. TAU: 27,3% (p=.09)
- Höheres Funktionsniveau lt. CGAS: DBT-C: 69,43 vs. TAU: 58 (p=.03)

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**

paul.plener@meduniwien.ac.at